NOTE XXVII.

DESCRIPTION D'UNE ESPÈCE ET VARIÉTÉ NOUVELLE DU GENRE STERNOCERA.

PAR

Ch. KERREMANS.

Sternocera viridimicans, spec. nov.

Long. 36—39 mill.; lat. 14—15 mill. — *Ovata, convexa, nigro-cyanescens; thorace flavo-fasciculato; elytris obscure viridi-metallicis, purpurescenteo-micantibus; corpore subtus nigro-cyanescente.*

Tête rugueuse à reflets irisés et revêtue d'une villosité jaunâtre; antennes noires. Prothorax fovéolé sur le disque, fortement rugueux sur les côtés inférieurs; ces fovéoles, allongées, semblent taillées dans le corselet en y formant des reliefs vermiculés, anastomosés, du fond desquels émergent des poils jaunâtres. Elytres larges, convexes, d'un vert métallique terne, à reflets pourprés; ponctuation dense, grossière, assez régulière; de chaque point émerge un poil très court, jaunâtre, à peine sensible. Dessous d'un noir bleuâtre, assez rugueusement ponctué, recouvert d'une villosité blonde, éparse. Pattes peu robustes, ponctuées, légèrement villeuses.

Des bords du lac Tanganyka, deux exemplaires: collections du jardin zoologique d'Amsterdam et de M. Neervoort van de Poll, qui a eu l'obligeance de me communiquer ces deux types.

Cette espèce, voisine de *St. pulchra* Waterhouse, me paraît former le passage entre celle-ci et *St. funebris* Boheman. Elle se distingue de la *pulchra* par sa coloration entièrement distincte et par l'absence des taches humérales oranges de l'élytre. La structure de cette dernière ne permet pas de confondre cette espèce avec la *funebris* Boh.

M. Neervoort van de Poll a également soumis à mon examen deux exemplaires provenant de Mamboia (Afrique centrale orientale) d'un *Sternocera* que je considère comme une variété de *St. funebris* Boheman, à laquelle je proposerai le nom de *var. aenescens*, entièrement d'un bronzé métallique brillant, avec les antennes et les élytres noires, et présentant tous les caractères spécifiques de la *St. funebris* vraie.